

Espèce	Dates semis	Dose semis Kg/ha	Profondeur de semis	Implantation	Exploitation	Conditions favorables	Conditions défavorables	VAL	Rendement attendu (TMS/ha)	Conditions d'exploitation
<b>Moha</b>	Mai à mi-juillet	20-25	1 à 2 cm max (roulage après)	70-90 jours	Fauche ++ Affouragement + Pâturage +	Résistante aux fortes chaleurs et stress hydrique  Eau à la levée (~10mm)	Fraicheur à l'implantation  Manque d'eau à la levée	0,7-0,8 UFL  60-70 PDI	3-5	Tous types de sols.  Mono-coupe.
<b>Teff grass</b>	Mi-mai à mi-juillet	10	A la volée (roulage avant et après)	50-60 jours	Foin ++ Pâturage +/- (!\ 1 <sup>er</sup> passage)	15°C - 38°C Résistante aux fortes chaleurs et stress hydrique	Fraicheur à l'implantation  Gel.	0,7-0,9 UFL  65-80 PDI	3-5	Tous types de sols.  Exploitation toutes les 4 semaines.
<b>Millet perlé</b>	Juin à Juillet	12-15	2cm (Roulage après)	60-70 jours	Pâturage ++ Fauche + (fanage délicat) Affouragement ++	Résistante aux fortes chaleurs et stress hydrique  Eau à la levée (~15mm)	Gel  Conditions humides, sols lourds, tassés, hydromorphes	0,7-0,8 UFL  65-70 PDI	3-5	Sols légers et acides.  Exploitation toutes les 3 semaines.
<b>Sorgho multi-coupe</b>	Mai à juillet	20-25 (sudan grass)  30-35 (hybride)	2cm (Roulage après)	60 jours	Fauche + Pâturage ++ Affouragement ++	Résistante aux fortes chaleurs et stress hydrique : Besoin en eau <40% VS Mais  Eau à la levée	Manque d'eau à la levée  Fraicheur (attention aux étés frais)  Gel	0,8 UFL  90-100 PDI	4-6	Tous types de sols.  Exploitation tous les 30 jours.  TOXICITE
<b>Chicorée</b>	Avril-mai ou août-septembre	5-6 (pur)  0,5-3 (mélange)	En surface, 1cm max (roulage après)	70-90 jours	Pâturage ++	Résistante aux fortes chaleurs et stress hydrique : racine pivot jusqu'à 1,5m.	Sols lourds et hydromorphes (risque pourriture racine).	0,8-0,95 UFL 85-120 PDI	4-6	Sols séchants, riches en MO.  Exploitation tous les 15-20jours voire toutes les semaines.  Pauvre en fibres, riches en tanins.